

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

Kullancs csípés

Kullancs csípés esetén nem kell feltétlenül pánikba esni, hiszen nem mindegyik kullancs fertőzött, ezért nem is biztos, hogy lesznek tünetek.

A kullancs eltávolítása: Ha kullancsot találunk magunkon akkor azt azonnal érdemes eltávolítani, mivel minél több időt tölt a bőrünkben annál nagyobb az esetleges fertőzés esélye. Patikában kapható erre alkalmas kullancs eltávolító eszköz, de egy otthoni csipesz is alkalmas erre a feladatra. A kullancs kiszedése közben vigyázni kell, hogy a testét ne szorítsuk erősen és semmi esetre se nyomjuk szét, mivel a kullancs gyomrában található a Lyme baktérium, mely a gyomor megnyomásával öklendezésre serkentheti az élősködőt, így a baktérium bekerülhet szervezetünkbe.

A kullancsot lassan kell eltávolítani, az óra járásával ellentétes irányba kell csavarni, nem szabad tépni, mert akkor leszakadhat a szájszerve, kicsit enyhén meghúzzuk majd várunk kicsit, hogy magától eleressze a bőrünket. Ha mégis leszakadna, semmiképpen sem próbáljuk kiszedni magunknak. Forduljon orvoshoz.

Érdemes a csípés dátumát, helyét feljegyezni, továbbá figyelni, hogy 1-2 héttel később bőrtünetek jelentkeznek-e.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni:

Amennyiben 1-2 héten belül bőrgyulladásos tünetek jelentkeznek, vagy tartós fejfájás, szédülés, hányinger, hőemelkedés, izomfájdalom, nyirokcsomó duzzanat fordul elő érdemes orvoshoz fordulni a súlyosabb következmények elkerülése érdekében.

Megelőzés:

Ha előre tudjuk, hogy olyan helyre megyünk, ahol fennáll a kullancs jelenlétének veszélye, érdemes a környezetbe olyan ruházatban menni, ami jól takar, így a kullancs bőrhöz jutásának lehetőségét csökkentve. *Továbbá számos riasztó aeroszol létezik manapság, melyek használata mindenképp javasolt, mielőtt természetbe megyünk. A hosszú távú tartós védetség elérése érdekében javasolt a védőoltás felvétele.*